



Μικρά σπρωφόρα

evan.glavakis@gmail.com

Όλα τα είδη προσφέροντα με τα ακόλουθα (εκτός και αν κατονομάζεται διαφορετικά)

- Σε 2λτ (11*11*21,5)
- Με φωτογραφία πλαστικοποιημένη και με ελληνική περιγραφή των χαρακτηριστικών της στην πίσω όψη.
- Συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.



Βατόμουρο

- Από τα πλέον δημοφιλή, γνωστό και ως blackberry. Εξαιρετική γεύση.
- Θεωρείται οξύφυλλο, αλλά τα καταφέρνει περίφημα και σε πιο αλκαλικά περιβάλλοντα. Εύκολο φυτό. Παράγει από την 1^η ή 2^η χρονιά.
- Δίνει δύο καρποφορίες: μια τ. Μαΐου-Ιούνιο (στο περσινό ξύλο) και τη δεύτερη τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο σε βλαστό του τρέχοντος έτους. Οπότε το χειμώνα κλαδεύουμε το 2 ετών βλαστό και αφήνουμε μόνο τον περσινό.



Μύρτιλο

- Από τα πλέον δημοφιλή, γνωστό και ως blueberry. Εξαιρετική γεύση.
- Είναι οξύφιλο. Θα χρειαστεί βοήθεια σε ένα αλκαλικό περιβάλλον (για μείωση pH, απορρόφηση ιχνοστοιχείων από ρίζα κτλ.).
- Δίνει μία καρποφορία. Παράγει από την 2^η χρονιά.



Σμέουρο

- Από τα πλέον δημοφιλή, γνωστό και ως raspberry, φραμπούζ κτλ. Εξαιρετική γεύση.
- Θεωρείται οξύφυλλο, αλλά τα καταφέρνει περίφημα και σε πιο αλκαλικά περιβάλλοντα. Εύκολο φυτό. Παράγει από την 1^η ή 2^η χρονιά.
- Δίνει δύο καρποφορίες: μια Ιούνιο (στο περσινό ξύλο) και τη 2^η τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο σε βλαστό του τρέχοντος έτους. Οπότε το χειμώνα κλαδεύουμε το 2 ετών βλαστό και αφήνουμε μόνο τον περσινό.



- Γνωστό και ως ριβήσιο. Υπόξινη γεύση.
- Θεωρείται οξύφυλλο, αλλά τα καταφέρει περιφρημα και σε πιο αλκαλικά περιβάλλοντα.
- Δίνει μια καρποφορία.
- Εύκολο φυτό. Παράγει από την 1^η ή 2^η χρονιά.
- Διατίθεται σε φυτά με κόκκινο χρώμα καρπού, μαύρο και (υπο-) κίτρινο.

Φραγκοστάφυλο



Μύρτιλο Σιβηρίας

- Αν και το όνομα του είναι «μύρτιλο», δεν είναι κοντινοί συγγενείς με το κλασικό μύρτιλο. *Vaccinium corymbosum* είναι το κλασικό, ενώ αυτό είναι *Lonicera kamtschatika*. Εξαιρετική γεύση.
- Είναι οξύφιλο. Θα χρειαστεί βοήθεια σε ένα αλκαλικό περιβάλλον (για μείωση pH, απορρόφηση ιχνοστοιχείων από ρίζα κτλ.).
- Δίνει μία καρποφορία. Παράγει από την 2^η χρονιά.



- Παλιό αγγλικό υβρίδιο. Καρπός πολύ μεγάλος. Εξαιρετική γεύση. Εύκολο φυτό.
- Δίνει δύο καρποφορίες: μια τ. Μαΐου-Ιουνίου (στο περυσινό ξύλο) και τη δεύτερη τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο σε βλαστό του τρέχοντος έτους. Οπότε το χειμώνα κλαδεύουμε το 2 ετών βλαστό και αφήνουμε μόνο τον περσινό.

Tayberry

Υβρίδιο Βατόμουρο x Σμέουρο



Σμέουρο μαύρο

- Είναι ξαδερφάκι με το κοινό σμέουρο. *Rubus idaeus* το κοινό, *Rubus occidentalis* το μαύρο. Εξαιρετική γεύση, μικρότερος καρπός από το κόκκινο.
- Δίνει δύο καρποφορίες: μια τ. Μαΐου-Ιούνιο (στο περσινό ξύλο) και τη δεύτερη τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο σε βλαστό του τρέχοντος έτους. Οπότε το χειμώνα κλαδεύουμε το 2 ετών βλαστό και αφήνουμε μόνο τον περσινό.

- Έχει αγκαθάκι, καρποφορεί σε βλαστό προηγούμενων ετών, με υπόξινη γεύση.
- Θεωρείται οξύφυλλο, αλλά τα καταφέρνει περίφημα και σε πιο αλκαλικά περιβάλλοντα.
- Δίνει μια καρποφορία.
- Εύκολο φυτό. Παράγει από την 2^η χρονιά.



Λαγοκέρασο



Το γνωστό μας ακτινίδιο σε αυτογόνιμη «εκδοχή».

Ακτινίδιο αυτογόνιμο



Ακτινίδιο arguta

- Συγγενές του γνωστού μας ακτινίδιο. Το βοτ. όνομα είναι *Actinidia arguta*, aka kiwiberry, ακτινίδιο Σιβηρίας κτλ.
- Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες, δεν είναι αυτογόνιμες ποικιλίες. Η πράσινη και η κόκκινη σταυρεπικονιάζονται ικανοποιητικά μεταξύ τους, μπορούμε να βάλουμε και επικονιάστρια (αρσενικό *arguta*).
- Μικρότερος καρπός από το συμβατικό, εξαιρετικής γεύσης, τρώγεται ολόκληρος (δεν έχει χνούδι).



Λεμονιά

- Αυτόριζο φυτό.
- Παράγει από τη 2^η χρονιά.
- Σχετικά ανθεκτική στο κρύο.
- Γλ 4 λτ.
- Ανήκει στο *Citrus limone*.



- Ποικιλία τύπου άγρια.
- Ασύγκριτη η γεύση και το άρωμα.
- Ξεκινάει νωρίς την καρποφορία και στο μέσο του καλοκαιριού (με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες) σταματά.
- Γλ 1,2 λτ.

Φράουλα άγρια



- Ποικιλία με λευκό χρώμα καρπό.
- Ασύγκριτη η γεύση και το άρωμα.
- Δεν είναι αυτογόνιμη, χρειάζεται παρουσία συμβατικής φράουλας.
- Ξεκινάει νωρίς την καρποφορία και στο μέσο του καλοκαιριού (με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες) σταματά.
- Γλ 1,2 λτ.

Φράουλα λευκή



Φράουλα κίτρινη

- Ποικιλία με κίτρινο χρώμα καρπό.
- Ασύγκριτη η γεύση και το άρωμα.
- Συγγενείς της άγριας φράουλας κοντύτερος από ότι η συμβατική.
- Ξεκινάει νωρίς την καρποφορία και στο μέσο του καλοκαιριού (με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες) σταματά.
- Γλ 1,2 λτ.



Πικραμυδαλιά

- **Φυτό εμβολιασμένο επί υποκειμένου, με ποικιλία πικραμυδαλιάς.**
- **Έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια λόγω των ιδιοτήτων του καρπού.**
- **Ανάπτυξη μεγάλου δένδρου (όπως η αμυδαλιά).**
- **Γλ 1,8 λτ.**



Συκιά δίχρωμη

- Η γνωστή μας συκιά, μόνο που ο καρπός δίνει ένα εντυπωσιακό ριγέ αποτέλεσμα!
- Σκούρη κόκκινη η σάρκα, με έντονη πλούσια γεύση.
- Γλ 3 λτ.



- **Ιαπωνική ποικιλία, μεγάλος καρπός.**
- **Αναπτύσσεται μέχρι μικρού μεγέθους δένδρο, καρποφορεί Σεπτέμβριο.**
- **Γλ 3 λτ.**

Τζιτζιφιά



Κρασιά

- Μεγαλόκαρπη, καλλιεργούμενη ποικιλία, εμβολιασμένο φυτό.
- Χρειάζεται σταυρεπικονίαση.
- Έχει μέτριες (αλλά όχι μηδενικές) απαιτήσεις σε ώρες ψύχους στο λήθαργο.
- Γλ 1,8 λτ.



Βερικοκιά νάνα

- Ποικιλία χαμηλής ανάπτυξης (νάνα).
- Γλ 3λτ.



- Ποικιλία χαμηλής ανάπτυξης (νάνα).
- Γλ 3λτ.

Αχλαδιά νάνα



- Ποικιλία χαμηλής ανάπτυξης (νάνα) με φύλλωμα πράσινου χρώματος.
- Γλ 3λτ.

Ροδακινιά νάνα



Ροδακινιά νάνα

- Ποικιλία χαμηλής ανάπτυξης (νάνα) με φύλλα κόκκινου χρώματος.
- Γλ 3λτ.



Καλλιεργούμενη ποικιλία σε 3λτ.

Καρυδιά εμβολιασμένη



Οινοποιήσιμες ποικιλίες (1,8λτ):

Cabernet Chauvignon, Chauvignon Blanc.

Αμπέλι



Οινοποιήσιμες ποικιλίες (1,8λτ):

Σουλτανίνα, Αττική, Άσπερμες ποικιλίες

Αμπέλι



- **Μηλιά με μοναδικό χαρακτηριστικό την κόκκινη σάρκα.**
- **Τραγανός καρπός, ελαφρώς υπόξινος.**
- **Θεωρούν τον καρπό κατάλληλο για διατροφή διαβητικών.**

Μηλιά κοκκινόσαρκα



evan.glavakis@gmail.com
